

Praxis für ambulante Anästhesie Cornelia Rind

Praxis für ambulante Anästhesie
Cornelia Rind Friedensstr. 8 30175 Hannover

Fax 0511/8997210
Mobil 0177/6607372

Patienteninformation zum Verbleib beim Patienten

Analgesedierung - was ist das?

Analgesedierung - auch "Dämmer Schlaf" genannt - ist ein allgemeines Anästhesieverfahren, mit dem die mit einer Zahnbehandlung oder Operation verbundenen Unannehmlichkeiten, wie z.B. örtliche Betäubungsspritzen, Geräusche medizinischer Geräte (Bohrer, Fräsen), Aufregung oder Ängste weitgehend ausgeschaltet werden können.

Wie wird eine Analgesedierung durchgeführt?

Nachdem Sie auf dem Behandlungsstuhl Platz genommen haben, werden Sie zunächst an einen Herz-Kreislauf-Monitor angeschlossen und es wird ein intravenöser Zugang gelegt. Über diesen Venenzugang werden dann Medikamente gespritzt, die Sie für die Zeit des Eingriffs in einen sehr entspannten, schlafähnlichen Zustand versetzen. Die völlige Schmerzausschaltung (auch für einige Zeit nach dem Eingriff) wird vom Operateur durch eine zusätzliche Injektion von örtlichem Betäubungsmittel in unmittelbare Nähe des Operationsgebietes erreicht. An diese Injektion und den weiteren Verlauf der Operation können sich die Patienten nicht mehr erinnern.

Für wen ist eine Analgesedierung geeignet?

Grundsätzlich lässt sich jede zahnärztliche Behandlung in Analgesedierung durchführen. Individuell kann es jedoch Kontraindikationen gegen diese Anästhesieverfahren bei einzelnen Patienten - zum Beispiel aufgrund des Alters oder etwaiger Vorerkrankungen - geben. Dieses wird in einem Vorgespräch mit dem Anästhesisten geklärt. Kinder können erst nach Vollendung des fünften Lebensjahres behandelt werden.

Was müssen Sie als Patient beachten?

Bis sechs Stunden vor der Analgesedierung können Sie essen, bis zu zwei Stunden vorher noch klare Flüssigkeit trinken (Wasser, Tee, Apfelsaftschorle). Ihre regelmäßig einzunehmenden Medikamente oder vom Zahnarzt verordnete Antibiotika etc. nehmen Sie auch am OP-Tag mit wenigen Schlucken Wasser ein.

- Tragen Sie bequeme Kleidung, weder Make-up noch Nagellack, keinen Schmuck.
- Bitte vor der OP Prothesen, Kontaktlinsen und Brille entfernen
- Entleeren Sie unmittelbar vor dem Eingriff noch einmal die Blase
- Sorgen Sie bitte unbedingt für eine Begleitperson, die Sie nach dem Eingriff mit dem PKW abholen, nach Hause bringen und möglichst auch einige Stunden auf Sie achtgeben kann.
- Sie dürfen in den folgenden 24 Stunden nach der Anästhesie nicht alleine am Straßenverkehr teilnehmen.